

## ອາຍຸກາຣໃຊ້ຈານຂອງຕົ້ນແກ້ວໃນສກາພໍາຫົວໜ້າ

### Utilization of *Murraya paniculata* L. in Waterlogged Conditions

ທີ່ຣານາຖ ກາລປັກໝໍ<sup>1\*</sup>, ປະພຸດ ພຣະມະສມບູຮັດ<sup>2</sup> ແລະ ສັຈາ ກົ່ອນພຣະມ<sup>2</sup>

Teeranat Kalpax<sup>1\*</sup>, Prapurt Promsomboon<sup>2</sup> and Sajja Konphrom<sup>2</sup>

**ບຫກຄັດຢ່ອ:** ຕົ້ນແກ້ວເປັນໄຟປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍມເປັນຍ່າງມາກໃນງານມົມທັນພຣະສາມາດອຸດັບຄວບອນໄດ້ອອກໃຫ້ດີເຕີແຕ່ຍັງໄມ້ມີກາຣທີ່ກົກຊາຍຸກາຣໃຊ້ຈານແລະຄວາມມື້ວິວຽດຂອງຕົ້ນແກ້ວເມື່ອຕ້ອງອູ່ໃນສກາພໍາຫົວໜ້າທ່ວມໜັງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ທ່າກ່າວທີ່ກົກຊາຍຸກາຣໃຊ້ຈານຂອງຕົ້ນແກ້ວທີ່ຢູ່ຄວາມສ່ວຍງາມ ໃນສກາພໍາຫົວໜ້າທ່ວມໜັງທີ່ອູ່ປຸລູກອູ່ໃນພື້ນທີ່ມີຮະດັບນ້ຳໄດ້ຕືນສູງ ໂດຍວາງແນກກາຣທົດລອງແບບສຸມໃນບັນລັກສມບູຮັດ (RCBD) ມີ 6 ກຣມວິວິທີ ໄດ້ແກ່ ກຣມວິວິທີຄວນຄຸມ (ໄມ້ມີນ້ຳທ່ວມໜັງ) ແລະ ມີນ້ຳທ່ວມໜັງ (ຈາກກັນກະຖານ) 5 ຮະດັບ ຕື່ອ 5, 10, 15, 20 ແລະ 25 ເຫັນດີເມຕຣ ຢັ້ງນ້ຳນານຕ່ອນຝຶ່ງ 35 ວັນ ພົບວ່າ ຕົ້ນແກ້ວສາມາດອຸດັບຫົວໜ້າທ່ວມໜັງຮະດັບ 5 ເຫັນດີເມຕຣໄດ້ດີແລະໄມ້ແສດງອາການໄດ້ ອ່າຍ່າງໄກ້ທຳມະຮະດັບນ້ຳ ແລະ ຮະຍະເວລານ້ຳທ່ວມໜັງນານເຂັ້ນ ຕົ້ນແກ້ວເຮີ່ມແສດງອາການໃບສູ່ລົງ ເປົ້າຢືນເປັນສີເໜື້ອງແລະໜຸດວ່າງ ຮະດັບນ້ຳທ່ວມໜັງ 10 ເຫັນດີເມຕຣ ຕົ້ນແກ້ວສາມາດອຸດັບສກາພ່ວຍງາມໄດ້ 21 ວັນ ທັງຈາກນັ້ນສາມາດມີວິວຽດແຕ່ຫັດຄວາມຜວຍງາມ ໃນຂະນະທີ່ຮະດັບນ້ຳທ່ວມໜັງ 15 ແລະ 25 ເຫັນດີເມຕຣ ຕົ້ນແກ້ວຄວາມສ່ວຍງາມໄດ້ປະມານ 7-14 ວັນ ພົດກວິຈີ້ຍໍທໍາໄຟທ່ານອາຍຸກາຣໃຊ້ຈານແລະລັກນະນະອາການທີ່ປຶກ້າຄວາມສາມາດໃນກາຣອູ່ຮົດຂອງຕົ້ນແກ້ວເມື່ອຖຸກນ້ຳທ່ວມໜັງຮະດັບຕ່າງໆ

**ຄໍາສຳຄັງ:** ໄນປະດັບ, ນ້ຳທ່ວມໜັງ, ຕົ້ນແກ້ວ, ກົມືທັນ

**ABSTRACT:** *Murraya paniculata* L. is one of most popular plants employed in landscape due to last long carbon dioxide absorption. However, no research has investigated the tolerance and durability of *Murraya paniculata* L. in waterlog or high water table condition. Therefore, this research used RCBD with six treatments which combined one non-waterlog treatment, 0 (control); and five waterlog treatments: 5, 10, 15, 20 and 25 cm. The waterlog treatments were soaked in pot filled up with water for 35 days. Results revealed that plants could be tolerant at 5 cm-water level without any abnormal sign. However, the higher water level and longer waterlogs duration, the more abnormal signs. Leaves were gradually wilted, turned yellow, and fell down, respectively. Even plants were soaked in the pot with 10 cm-water level, they were still beautiful and lasted for 21 days. Then after that period, the plants still survived but without any attractiveness. This study also found that at waterlog level up to 15-25 cm, the plants survived with beautiful pattern lasted for 7-14 days. These results could indicate that the ability of survival of *Murraya paniculata* L. was different depending on waterlog levels.

**Keywords:** ornamental plant, waterlogged, *Murraya paniculata* L., landscape

<sup>1</sup> ກາຄວິຊາພື້ນຄວາມ ຄະນະເກມທະ ກໍາແພງແສນ ມາຮັກທາລີຍເກມທະຄາສຕຣ ກໍາແພງແສນ ນຄຣປູນ

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakorn Pathom

<sup>2</sup> ຄະນະເກມທະຄາສຕຣ ແລະ ຖ້າພາກຮຽນຊາດີ ມາຮັກທາລີຍເກມໂໂລຢີ່ຈາກມະຄດຕະວັນອອກ ຂລນູ໌

Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bang Pra campus, Chonburi

\* Corresponding author: jl\_61@hotmail.com

## บทนำ

ต้นแก้ว (*Murraya paniculata* L.) หรือ Andaman satinwood, Chinese box tree หรือ Orange jessamine นิยมปลูกประดับทั่วไปในงานภูมิทัศน์เมืองและสวนในบ้าน สามารถจัดเข้ากับสวนสไตล์ต่างๆ ได้ดี ด้วยใบเป็นสีเขียวเข้ม การปลูกเลี้ยงได้ทั้งกลางแจ้งในร่มและริมทางเดินจากการศึกษาความสามารถการสังเคราะห์แสงระดับเรือนผุ่ม (Canopy Photosynthesis) ในรอบวัน (24 ชั่วโมง) กับต้นแก้วที่ปลูกในกระถางที่มีค่าเฉลี่ยพื้นที่ใบต่อต้น  $6,393-15,072\text{cm}^2$  (0.30-0.60 ตารางเมตร) พบร่วงคูลบัน  $\text{CO}_2$  ของต้นแก้วเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีแสงเริ่มจากช่วงความเข้มแสงต่ำ (น้อยกว่า  $300 \mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ ) และมีค่าต่อหน่วยคงที่ที่ลดลงช่วงความเข้มแสงประมาณ  $300-1800 \mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$  (ธีวนานุ, 2548) สำหรับการศึกษาถึงอิทธิพลของน้ำท่วมชั่ว พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาถึงความสามารถทนต่อน้ำท่วมชั่วของพันธุ์ต้นต่อสัมม (ฤทธิพันธ์, 2548) และการตอบสนองเพื่อการฟื้นฟูต่อชุดในต้นชุมพู่ (ศุภิกา, 2548; พันธ์นิตา, 2548) พบร่วงความเสียหายจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวแปร เช่น ชนิด ความแข็งแรงของต้นไม้ สภาพของน้ำที่ท่วมชั่ว ชนิดของดินที่ปลูก แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้นและลม ตัวอย่างอาการที่เกิดกับต้นไม้ผลในสภาพน้ำท่วมชั่วเนื่องจากขาดออกซิเจนในต้นต่อสัมม เช่น อาการในเหลือง อาการทึบใน ดอกและผล การสร้างราก เปิดบริเวณระดับน้ำ อาการตอบสนองอื่นๆ ทางศรีวิทยา เช่น การลดการขยายตัว การปิดปากใบ เป็นผลลัพธ์เนื่องให้การสร้างอาหารลดลง ซึ่งการเจริญเติบโตของพืชและอัตราหายใจในต้นไม้ ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาถึงความทนทานและอายุการใช้งานของไม้ประดับหรือต้นแก้ว เมื่อต้องปลูกในสภาพที่มีระดับน้ำได้ต้นสูงหรืออยู่ในสภาพน้ำท่วมชั่วที่ทำให้ทราบถึงระดับความอ่อนแอก่อนความทนทาน จำนวนวันที่สามารถคงสภาพความสวยงามและความมีชีวิตต่อ รวมถึงระดับน้ำท่วมชั่วที่ไม่ส่งผลให้ต้นแก้วแสดงอาการและยังคงความ

สวยงามในการปลูกประดับ เพื่อเป็นข้อมูลการเลือกใช้พืชพรรณเพื่อสภาพแวดล้อมต่อไป

## วิธีการศึกษา

ทำการศึกษาอย่างการใช้งานของต้นแก้วในสภาพน้ำท่วมชั่ว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัย กำแพงเพชร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสถาบันการศึกษาตั้งแต่พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 3 ชั้ว มี 6 กรรมวิธี (Treatments) ได้แก่ กรรมวิธีควบคุมหรือน้ำไม่ท่วมชั่ว (กรรมวิธีควบคุม) และน้ำท่วมชั่ว (จากกันกระถางและเติมน้ำทุกวันให้ระดับน้ำคงที่) 5 ระดับคือ 5, 10, 15, 20 และ 25 เซนติเมตร เริ่มจากการปลูกต้นแก้วที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งตอนลงในกระถางพลาสติกสีดำเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว ตัดแต่งให้มีขนาดใกล้เคียงกัน คือขนาดทรงพุ่ม 40 เซนติเมตรและความสูงต้น 60 เซนติเมตร นำไปปลูกในสภาพกลางแจ้งเป็นเวลา 2 เดือน ก่อนทำการทดลองและใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ครั้งละ 1 ช้อนชา/ต้น สปดาห์ละ 1 ครั้ง รดน้ำโดยใช้กระบอกดูดทุกวันละสองครั้ง ครั้งละ 3 ลิตรในตอนเช้า (9:00 น.) และบ่าย (16:00 น.) ต้นปลูกที่ใช้เป็นต้นร่วน (loam) มีสัดส่วนดินทราย 40% ดินตะกอน 41.67% ดินเหนียว 18.33% ค่าเฉลี่ยความชื้นดิน 13% ก่อนการท่วมน้ำได้ทำให้ต้นปลูกอิ่มตัวด้วยน้ำโดยการรดน้ำ 3 ลิตร และตั้งทึบไว้จนน้ำไม่หยดลงจากก้นกระถางเป็นเวลา 90 นาที (ความลึกดินปลูก 20 เซนติเมตร) ก่อนเช้าในกระถางมีตัวต่ำและชั้นน้ำตามกรรมวิธีที่กำหนด

หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลทุกสปดาห์เป็นเวลา 5 สปดาห์ ได้แก่ ข้อมูลลักษณะทั่วไปที่แสดงถึงความสมบูรณ์สวยงามและอายุการใช้งานทางภูมิทัศน์ คือรูปถ่ายด้านข้าง (side view) เพื่อเปรียบเทียบความ

หนาแน่นทรงพุ่ม บันทึกความเขียวของใบโดยสูมวัดสีใน 100 ใบต่อต้นและเทียบกับสมุดเทียบสี รุ่น R.H.S. COLOUR CHART บันทึกจำนวนใบร่วงต่อวัน (ใบ) และบันทึกอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นและหาค่าเฉลี่ยความยาวยอด (เซนติเมตร) จำนวน 3 ยอดต่อหน่วยทดลอง (ใช้การวิเคราะห์ชี้อ้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS) จำนวนรากพื้นที่ (ราก) นับเป็น 1 รากเมื่อรากมีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ระยะเวลาที่เริ่มพบรากอยแตกของลำต้น (วัน) ความยาวราก (เซนติเมตร) วัดความยาวรวมจากโคนถึงปลายรากаждบันทึกลักษณะและการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในแปลงทดลองด้วยชุดตรวจวัดสภาพอากาศ DL2e Data Logger โดยระหว่างการทดลองมีค่าความชื้นแสง 0.04 – 0.18 ตารางกิโลวัตต์ ( $27,320 - 122,940$  ลัคช์) ค่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่ละ 54-85 และอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  $26.59-31.00$  องศาเซลเซียส

## ผลการศึกษา

### ลักษณะทั่วไปและความสมบูรณ์ของต้น

ต้นแก้วที่นำมาใช้ในการทดลองในสปดาห์แรกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มเฉลี่ย 40 เซนติเมตร ความสูงต้นเฉลี่ย 60 เซนติเมตร พุ่มหนาทึบ ในมีสีเขียวเข้มเป็นมัน เปลือกของลำต้นมีสีขาวเทาและมีการแตกร่องตามยาวของเปลือกกล้าด้านทรงพุ่มและความสมบูรณ์ของต้น ด้านความยาวของต้นแก้วทั้ง 6 กรมวิธี ที่น้ำท่วมชั้ง 21 วัน (สปดาห์ที่ 3) ไม่มีความแตกต่างกันแต่ระดับน้ำท่วมชั้งสูงผลให้ค่าเฉลี่ยความยาวยอดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยังคงสถิติ ( $P < 0.01$ ) ในกรมวิธีที่ 2-6 ในสปดาห์ที่ 4 และ 5 ยอดอยู่ในเมล็ดกษะณะและเหี่ยกลงไม่ยึดติดเหมือนกับกรมวิธีควบคุม และมีต้นตายในกรมวิธีที่ 5 (น้ำท่วมชั้ง 25 ซม.) และกรมวิธีที่ 6 (น้ำท่วมชั้ง 25 ซม.) (Table 1)

Table 1 Average Shoot Length of *Murraya paniculata* L. at the Period of Weeks 1-5 (35 days)

Water Levels	Average Shoot Length (cm.) (18 July – 21 August 2013)				
	Week1	Week2	Week3	Week4	Week5
Control (0 cm)	9.47	10.57	11.30	11.63 <sup>a</sup>	11.90 <sup>a</sup>
5 cm	8.60	10.63	10.97	11.20 <sup>ab</sup>	10.97 <sup>ab</sup>
10 cm	7.97	9.10	9.47	9.23 <sup>b</sup>	9.10 <sup>b</sup>
15 cm	8.67	9.03	9.50	8.93 <sup>b</sup>	3.17 <sup>c</sup>
20 cm	9.13	10.17	9.77	6.10 <sup>c</sup>	dead
25 cm	8.93	9.03	8.57	dead	dead
Average	8.79	9.76	9.93	7.85	5.86
F-test	ns	ns	ns	**	**
C.V.%	10.73	15.29	16.05	53.19	88.84

ns and \*\* indicate non-significant and significant at  $P < 0.01$ , respectively. Means in the same column with the different letters are significantly different at  $P < 0.01$ .

ผลการเบรี่ยบเทียบจากรูปถ่ายด้านข้างเพื่อแสดงอิทธิพลของระดับน้ำท่วมชั้งประกอบกับจำนวนใบร่วงต่อวัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสีใบซึ่งมีความสอดคล้องกัน ต้นแก้วในแต่ละกรมวิธีตอบสนองต่อระดับน้ำแตกต่างกันเมื่อเทียบกับกรมวิธีที่ 1 (ไม่มีน้ำ

ท่วมชั้ง) ที่เจริญเติบโตตามปกติ ในมีสีเขียวเข้ม ค่าเฉลี่ยใบร่วงตลอด 35 วันเท่ากับ 1.11 ใบต่อต้น สำหรับกรมวิธีอื่นๆ ต้นแก้วแสดงอาการใบเหลือง เส้มใบเหลือง ในสูตรและใบร่วงในที่สุด ในกรมวิธีที่ 2-6 ผลมีดังนี้ กรมวิธีที่ 2 (น้ำท่วมชั้ง 5 ซม.) ต้นแก้วมีทรงพุ่ม

รายงานและสืบไม่เปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยในร่วง ตลอด 35 วัน 2.00 ในต่อต้น สำหรับกรรณวิธีที่ 3 (น้ำท่วมชั้ง 10 ซม.) พぶใบร่วงมากในสปดาห์ที่ 4 เฉลี่ย 14.71 ในต่อต้น กรรณวิธีที่ 4 (น้ำท่วมชั้ง 15 ซม.) ในร่วงมากในสปดาห์ที่ 4 เฉลี่ย 38.81 ในต่อต้น ส่วน กรรณวิธีที่ 5 และ 6 (น้ำท่วมชั้ง 20 และ 25 ซม.) แสดง อาการใบร่วงตั้งแต่สปดาห์ที่ 2 และใบร่วงมากใน สปดาห์ที่ 3 โดยกรรณวิธีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยใบร่วง 6.57 และ 17.62 ในต่อต้น และกรรณวิธีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยใบร่วง 23.38 และ 49.19 ในต่อต้น ทั้งนี้สรุปค่าเฉลี่ยใบร่วง ตลอด 35 วันของกรรณวิธีที่ 3,4,5,6 เพ่ากับ 9.35, 14.05, 26.93 และ 40.01 ในต่อต้น ดูจากภาพ Figure




Figure 1: Effects of waterlog levels of *Muraya paniculata* L., A=0 cm (control), B=5 cm, C=10 cm, D=15 cm, E=20 cm and F=25 cm. Treatments A, B, and C were survived with beautiful leaves but D,E, and F presented chlorosis symptom and fell down after flooding according to time duration.




Figure 2 Effects of waterlog levels on leaf color in week 2 (14 days). Results revealed yellow - Green leaf color grouped with R.H.S. COLOUR CHART.




Figure 3 Roots length of 5cm - water level (left), and 25 cm water level (right) at the period of 35 days

1 และ Figure 2 ที่ระดับน้ำท่วมชั้ง 15-25 ซม. พぶใบ เหลืองและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทำให้ต้นแก้วขาดความ สวยงามโดยเฉพาะในสปดาห์ที่ 3 ด้านความยาวราก ทั้ง 6 กรรณวิธี มีค่าเฉลี่ยเพ่ากับ 32.33, 29.33, 31.67, 28.33, 25.00 และ 26.67 เซนติเมตร ซึ่งกรรณวิธีที่ 6 พぶจ่าจากมีความเสียหาย กลิ้นเหม็นจุน และมีสีเขียว (Figure 3) ในส่วนของ Table 2 อาการใบร่วงส่งผลให้ พุ่มใบเปลี่ยนไปขัดเจนในสปดาห์ที่ 4 สำหรับกรรณวิธี ครั้งนี้ไม่พบการเกิดรากพิเศษ (adventitious root) และ การเกิดรอยแตกของลำต้น (lenticels information) ของต้นแก้วที่น้ำท่วมชั้ง 35 วัน

**Table 2** Effects of water depth levels as 0 (control), 5, 10, 15, 20 and 25 cm for 35 days. The 5cm - water depth level with no abnormal sign. Then with the higher water levels (10-25 cm) and longer waterlog duration, leaves were gradually wilted, turned yellow. The plants survived without any beauty.

Water Dept Levels	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5
0 cm					
5 cm					
10 cm					
15 cm					
20 cm					
25 cm					

## วิจารณ์

การแสดงอาการของต้นแก้วที่น้ำท่วมชั่ง 5 ระดับ ในระยะเวลา 5 สัปดาห์หรือ 35 วัน สามารถเป็นอย่างถึง ตายกการใช้งานเมื่อต้นแก้วปลูกอยู่ในพื้นที่ระดับน้ำได้ต้นสูงหรือมีน้ำท่วมชั่ง ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับต้นแก้ว ได้แก่ อาการใบเหลือง (chlorosis) ซึ่งเกิดในสภาพน้ำท่วมชั่ง โดยเฉพาะในใบที่ยังไม่โตเต็มที่ เกิดอาการเสื่อมสภาพ (senescence) ซึ่งสัมพันธ์กับการลดลงของปริมาณเชโดไคโนน (cytokinin) และจินเยอูลิลลิน (gibberellin) และการเพิ่มขึ้นของออกซิโนน ABA หรือ abscisic acid และเอทธิลีน (ethylene) (Huang, 2000) ทำให้ใบเหลืองและร่วงในที่สุด รวมถึงการจะงอก การเจริญเติบโตของยอดอ่อนอึดด้วย สำหรับรากและกาวยืดยาวของรากอ่อนให้มากในสภาพที่มีออกซิเจนจำกัด (Kramer, 1983) และ มีผลกับการดูดซึมน้ำจากอาหารต่างๆ ที่จะช่วยในการเจริญเติบโตของยอดและราก น้ำหนักแห้งและผลผลิต มีผลต่อกระบวนการสรีรวิทยาต่างๆ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของน้ำ พืช ดิน คาร์บอโนไดออกไซด์และออกซิเจน ธาตุอาหารและกระบวนการเจริญเติบโตของยอดและราก ซึ่งแตกต่างกันตามความต้องการพืช อยุ่ และลักษณะของสรีรวิทยา และยังขึ้นอยู่กับสภาพดินปลูกที่มีอุณหภูมิ สารละลายน้ำ และธาตุอาหารที่สามารถใช้ได้ (Huang, 2000) สำหรับต้นแก้วที่ยืนต้นด้วยน้ำที่สูงขึ้น และระยะเวลาที่น้ำท่วมชั่งนานนี้ รี (2540) กล่าวว่า ความสามารถในการยั่งยืนของต้นไม้ต้องมาจากความทนทานต่อสภาพน้ำท่วมชั่ง ความสมบูรณ์ หรือความแข็งแรงของต้นไม้ผลที่มีไปเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีการสร้างอาหารสะสมไว้ค่อนข้างมากกว่าต้นที่กำลังผลใบอ่อน ทั้งนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงชนิดและระดับน้ำท่วมชั่งที่สูงขึ้นในแต่ละฤดูกาล เพื่อทราบถึงศักยภาพของพืชในสภาพแวดล้อมต่างๆ

## สรุป

ต้นแก้ว (*Murraya paniculata* L.) ที่น้ำท่วมชั่งต่อเนื่องนาน 35 วัน ทนต่อน้ำท่วมชั่งสูง 5 เซนติเมตรได้ดี ส่วนระดับน้ำท่วมชั่งสูง 10 เซนติเมตร สามารถคงสภาพสวยงามได้ 21 วัน และสามารถมีชีวิตครอบครองได้ตลอดระยะเวลา 35 วันแต่ขาดความสวยงามระดับน้ำท่วมชั่งสูงตั้งแต่ระดับ 15 เซนติเมตรเป็นต้นไป ต้นแก้วสามารถคงสภาพสวยงามได้ประมาณ 7-14 วัน หากน้ำท่วมชั่งสูง 20 เซนติเมตร ต้นแก้วจะยืนต้นตายใน 26 วัน เช่นเดียวกับน้ำท่วมน้ำท่วมชั่ง สูงขึ้นเป็น 25 เซนติเมตร ต้นแก้วจะยืนต้นตายเร็วขึ้นในเวลา 20 วัน

## เอกสารอ้างอิง

- ธีรนาฏ ภาณีวงศ์. 2548. ผลของการทรงฟุ่มต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสงระดับเรือนฟุ่มของต้นไม้แก้วแก้ว. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. นครปฐม.
- พันธ์เดชา ยาอินทร์. 2548. ผลของ iodio และการใช้ดูดซึ่งการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านรอยแตกบริเวณโคนต้นต่อการเกิดรากพิเศษของรากฟุ่มในสภาพน้ำท่วม. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. นครปฐม.
- รี เศรษฐกิตติ. 2540. กรณีศึกษา: สภาพน้ำท่วมส่วนของศูนย์พยุงคู่หันรัฐในปี 2539 ในอุทกภัยผลกระทบต่อสถานผลไม้และแนวทางแก้ไข. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- ศุภกิจ ศุภะจันทร์. 2548. ผลของ triiodobenzoic acid และการใช้ดูดซึ่งการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านรอยแตกบริเวณโคนต้นต่อการเกิดรากพิเศษของรากฟุ่มในสภาพน้ำท่วม. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. นครปฐม.
- ศุภชิพันธ์ รัตนลึงห์. 2548. ผลของสภาพน้ำท่วมชั่งต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและสัญญาณวิทยาของต้นต่อสัมพันธ์ต่างๆ และสัมพันธ์ของรากฟุ่นที่ดื่มน้ำด้วย Troyer Citrange. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาควิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. นครปฐม.
- Huang, B. 2000. Waterlogging responses and interaction with temperature, salinity, and nutrients. Plant environment interaction. 2nd. New York, USA: 263:282.
- Kramer, P.J. 1983. Root growth and function. In P.J. Kramer, ed. Water relations of plants. San Diego, CA: Academic Press, pp 120-145.